

№	Целевые показатели МЗ РФ (19 сигнальных (индикативных) показателей на 2017 год)	Рекомендуемые значения (в %)
1	Доля больных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, которым выполнен тромболизис (на догоспитальном и госпитальном этапах)	не менее 25%
2	Доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с острым коронарным синдромом, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром	не менее 30-35%
3	Доля умерших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом в стационарах субъекта от общего количества выбывших больных с ишемическим и геморрагическим инсультом	менее 20%
4	Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением	не менее 35%
5	Доля больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания	не менее 40%
6	Доля больных с ишемическим инсультом, которым выполнен системный тромболизис	не менее 5%
7	Доля больных с острым коронарным синдромом умерших в первые сутки от числа всех умерших с острым коронарным синдромом за период госпитализации	менее 25%
8	Доля населения субъекта Российской Федерации, вакцинированного против гриппа	30% (на конец 2017 года)
9	Доля пострадавших в результате ДТП, госпитализированных в травмацентры 1 и 2 уровня, от всех пострадавших в результате ДТП, госпитализированных во все стационары субъекта РФ	не менее 82%
10	Доля ЗНО, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии)	не менее 55,5%
11	Доля больных с ЗНО, умерших в трудоспособном возрасте, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте больных с ЗНО	не менее 90%
12	Доля тяжёлого оборудования, используемого в двухсменном и/или круглосуточном режиме от общего числа оборудования, используемого при оказании медицинской помощи	не менее 75%
13	Доля случаев МЛУ/ШЛУ ТБ, эффективно закончивших лечение по IV и V режимам химиотерапии, (из когорты 2014 г. для плана 2016 г.)	не менее 60%
14	Доля впервые выявленных больных туберкулезом с бактериовыделением, которым проведен тест на лекарственную чувствительность возбудителя (ТЛЧ) до начала лечения	не менее 95%
15	Доля пациентов с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл, охваченных химиопрофилактикой туберкулеза	не менее 95%
16	Доля больных со злокачественными новообразованиями, выявленных активно	не менее 23,5%
17	Доля лиц, взятых на диспансерное наблюдение из числа с впервые в жизни установленным диагнозом болезней печени и поджелудочной железы	не менее 70%
18	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до места ДТП со сроком доезда до 20 минут	не менее 95%
19	Доля лиц с пневмонией, пролеченных в стационаре, от числа всех заболевших пневмонией	не менее 85%